

# ဘယ်သူတွေက ကိုဗစ်-၁၉ အားမြှင့်ဆေး (Covid-19 Booster Shot) ကို ထိုးသင့်သလဲ။



အားမြှင့်ဆေးတွေက (Booster Doses) ဆက်လက်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။  
 ထပ်ဆင့်ဆေးတွေက (Additional Doses) အတော်အတန် သို့မဟုတ် ကြီးကြီးမားမား ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းနေတဲ့သူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။

## PFIZER VACCINE

အားမြှင့်ဆေး (Booster Shot) ကို ဘယ်သူတွေ ထိုးသင့် သလဲ။  
 အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူများ၊ နာတာရှည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူနေတဲ့ သူများ  
 အသက် ၅၀-၆၄ နှစ်အကြား ရောဂါ အခံရှိတဲ့သူများ

အောက်ပါ သူတွေရော အားမြှင့်ဆေးကို (Booster Shot) ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ် -  
 အသက် ၁၈-၄၉ နှစ် အကြား ရောဂါ အခံရှိတဲ့သူများ၊ ဥပမာ အဝလွန်ရောဂါ၊  
 ဆီးချိုရောဂါ (အမျိုးအစား ၁၊ ၂) အလုပ်အကိုင်အခြေအနေကြောင့် ကိုဗစ်-  
 ၁၉ နဲ့ ထိတွေ့မှုများနိုင်ပြီး ကူဆက်ခံရနိုင်တဲ့ အသက် ၁၈-၆၄ နှစ် အကြားရှိသူများ၊  
 ဥပမာ - ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ အရေးပေါ်ဝန်ထမ်းများ (ရဲ၊ မီးသတ် စသည်)

အားမြှင့်ဆေးတွေ (Boosters) ကို ၂ ကြိမ်ထိုးရတဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ဒုတိယအကြိမ် ထိုးပြီးတဲ့နောက်  
 အနည်းဆုံး ၆ လ အကြာမှသာ ထိုးသင့်ပါတယ်။



## MODERNA VACCINE

အားမြှင့်ဆေးကို တရားဝင်  
 ခွင့်မပြုရသေးပါဘူး။  
 အစိုးရကျန်းမာရေးပညာရှင်များမှ  
 စစ်ဆေးသုံးသပ်မှုကို  
 ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။

## JOHNSON & JOHNSON VACCINE

အားမြှင့်ဆေးကို တရားဝင်  
 ခွင့်မပြုရသေးပါဘူး။  
 အစိုးရကျန်းမာရေးပညာရှင်များမှ  
 စစ်ဆေးသုံးသပ်မှုကို  
 ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။



[orangecountync.gov/GetYourShot](https://orangecountync.gov/GetYourShot)

